

Годованець О.І., Хомишин О.Т.

ПОШИРЕНІСТЬ ЗУБОЩЕЛЕПНИХ АНОМАЛІЙ ТА ДЕФОРМАЦІЙ СЕРЕД ДІТЕЙ БУКОВИНИ

Кафедра стоматології дитячого віку

Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці

homyshyn_oleksandr@bsmu.edu.ua

Актуальність. Зубощелепні аномалії та деформації займають чільне місце в практиці дитячого стоматолога. Дедалі частіше вони діагностуються в соматично- та стоматологічно здорових дітей та стають причиною функціональних порушень не тільки в щелепно-лицевій ділянці, але й призводять до дисфункції органів дихання, травної та ендокринної систем організму, стійких психотерапевтичних розладів, що посилюються з віком.



Мета дослідження було виявлення потреби в ортодонтичній допомозі дітям Буковини.



Матеріали та методи дослідження. З метою виявлення потреби в ортодонтичній допомозі дітям Буковини нами було оглянуто 250 підлітків віком 12-15 років. Стоматологічний огляд включав збір анамнезу, скарг, зовнішній та внутрішньоротовий огляд. Для уточнення діагнозу вивчали діагностичні моделі щелеп. Із цією метою у хворих одержували повні анатомічні відбитки, відливали моделі, визначали центральне співвідношення щелеп з фіксацією в анатомічному оклюдаторі.

Результати дослідження. Аналіз частоти виявлення різних аномалій та деформацій зубощелепної ділянки засвідчив, що серед ортодонтичних проблем виділяються аномалії прорізування зубів, які були встановлені в 35,12 % обстежених дітей, аномалії кількості зубів – у 18,37 %. Аномалії та деформації зубних рядів зустрічалися з частотою 33,85 %. Поширеність аномалій прикусу склала 34,29 %. Посеред патологічних видів прикусу домінував дистальний, на другому місці за частотою є глибокий та мезіальний прикуси. Дещо рідше зустрічаються відкритий та перехресний види прикусу.

Висновок. Отримані нами дані певною мірою характеризують стан ортодонтичної патології серед дитячого населення Буковини і можуть бути використані для удосконалення лікувально-профілактичної стоматологічної допомоги у регіоні.

