

Годованець О.І.

Вищий державний навчальний заклад України
“Буковинський державний медичний університет”

Кафедра стоматології дитячого віку

godovanec.oksana@bsmu.edu.ua

ПОШИРЕНІСТЬ ОРТОДОНТИЧНОЇ ПАТОЛОГІЇ В ДІТЕЙ ЗА УМОВ УРАЖЕННЯ ЩИТОПОДІБНОЇ ЗАЛОЗИ

Гіперплазія щитоподібної залози впливає на:

- процеси формування та мінералізації твердих тканин зуба (*Біденко Н.В., 1997; Шустова О.А., 2004; Воляк Л.М., 2013; Рожко О.П., 2015*);
- метаболічні процеси в тканинах пародонта та ортодонтичний статус (*Kerimov E.E. et al., 2009; Сарафанова А.Б., 2010; Сутаева Т.Р., 2010; Zahid T.M. et al., 2011; Колесник К.А., 2014; Bassett J.H. et al., 2015*);
- морфо-функціональний стан слинних залоз (*Асиятилов Г.А., 2009; Iakovou I. et al., 2014*).

Мета дослідження - встановити поширеність ортодонтичної патології в дітей із супутньою патологією щитоподібної залози.




Матеріали та методи дослідження:

- **Клінічні:** загальний стоматологічний огляд; визначення індексів карієсу (*кпз*, *кпп*, *КПВз*, *КПВп*, *КПВз+кпз*, *КПВп+кпп*, *НІК*); визначення індексів гігієни (Greene-Vermillion, Silness-Loe); визначення пародонтальних індексів (РМА, СРІ); аналіз діагностичних моделей.
- **Статистичні**


Результати дослідження.

Поширеність карієсу зубів у дітей із супутньою патологією щитоподібної залози



- Примітка: * - вірогідна відмінність показників від показника групи порівняння, $p < 0,05$.

Поширеність зубощелепних аномалій і деформацій у дітей із супутньою патологією щитоподібної залози



- Примітка: * - вірогідна відмінність показників від показника групи порівняння, $p < 0,05$.

Частота виявлення зубощелепних аномалій і деформацій у соматично здорових та хворих на дифузний нетоксичний зоб у дітей залежно від віку

