

Годованець О.І., Муринюк Т.І.

Кафедра стоматології дитячого віку

Буковинський державний медичний університет м, Чернівці


murynjuk_taras@bsmu.edu.ua

ОСОБЛИВОСТІ ХІРУРГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ОРТОДОНТИЧНИХ ПАЦІЄНТІВ

Актуальність. Операція видалення третіх молярів є частим етапом ортодонтичного лікування пацієнтів. На сьогодні багато вчених рекомендують для профілактики розвитку зубощелепних аномалій видаляти зародки цих зубів у дітей віком від 10 років, тобто до початку періоду формування коренів. Крім того встановлено, що післяопераційний період у пацієнтів більш раннього віку проходить ліпше і з меншою кількістю ускладнень.



Мета дослідження. Метою нашої роботи було проаналізувати потребу в проведенні операції видалення третіх молярів (зародків) за ортодонтичними показаннями.



Матеріали та методи дослідження. Нами проведено ретроспективний аналіз 200 медичних карток, діагностичних моделей та ортопантограм ортодонтичних пацієнтів.

Встановлено, що в 85,5 % випадків ортодонтичне лікування супроводжувалося видаленням третіх молярів та було обумовлене скученістю зубів, яка, своєю чергою, розвивалася внаслідок різних чинників. Операція видалення третіх молярів проводилася в пацієнтів віком від 9 до 25 років та на різних етапах ортодонтичного лікування. Розподіл пацієнтів за віковим критерієм був таким: у 9,94 % випадках хірургічне втручання у вигляді гермектомії здійснювалося у 9-12 років; 60,24 % - у віці 12-16 років та 29,82 % - у віці 16-25 років. 2/3 пацієнтів перенесли дане оперативне втручання до початку ортодонтичного лікування, а третина – на заключному етапі лікування.

Результати дослідження. Встановлено, що в 85,5 % випадків ортодонтичне лікування супроводжувалося видаленням третіх молярів та було обумовлене скученістю зубів, яка, своєю чергою, розвивалася внаслідок різних чинників. Операція видалення третіх молярів проводилася в пацієнтів віком від 9 до 25 років та на різних етапах ортодонтичного лікування. Розподіл пацієнтів за віковим критерієм був таким: у 9,94 % випадках хірургічне втручання у вигляді гермектомії здійснювалося у 9-12 років; 60,24 % - у віці 12-16 років та 29,82 % - у віці 16-25 років. 2/3 пацієнтів перенесли дане оперативне втручання до початку ортодонтичного лікування, а третина – на заключному етапі лікування.

Висновок. Таким чином, найчастіше операцію видалення третіх молярів за ортодонтичними показаннями проводять у віці 12-16 років перед початком активного періоду ортодонтичного лікування.